

Una persona que toma **finasteride** para tratamiento de la hiperplasia prostática benigna (HPB) ¿Puede donar?*



Proscar



Propecia



finasteride

Aceptar después de 30 días de terminado tratamiento

Una persona que toma **dutasteride** para tratamiento de la hiperplasia prostática benigna (HPB) ¿Puede donar? *



Avodart



dustanesteride

Aceptar después de 6 meses de terminado tratamiento

Una persona que toma **Tamsulosina** para tratamiento de la hiperplasia prostática benigna (HPB) ¿Puede donar?*



Tamsulon



Prosina



Tamsulosina

Toda persona que toma **Tamsulosina** para para tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y cumple con los demás requisitos pre donación, **pueden donar sangre.**




Entregar al donante las recomendaciones generales **PRE** y **POSDONACIÓN** como hidratación oral y haber comido dentro de las 2 horas antes de la donación

Una persona que usó **TESTOSTERONA** por indicación médica ¿Puede donar?*



Testosterona undecanato



Testosterona undecanato



Testosterona enantato

Aceptar después de 4 meses de terminado tratamiento



En el caso que el medicamento sea indicado para **anemia aplásica** el diferimiento o aplazamiento del potencial donantes es **permanente**.

Una persona que toma **Tamsulosina + Dutasteride** para tratamiento de la hiperplasia prostática benigna ¿Puede donar?*



Duodart



Tamsulon Duo

**Aceptar después de 6 meses de terminado
tratamiento**

Una persona que tomó Medicamentos para disfunción eréctil o uso recreativo

¿Puede donar? *

Sildenafil



Tadalafil



Vardenafilo



Se difiere por
12 horas

Se Acepta